



5 vajalikku toodet sellel hooajal – igaks olukorraks põllul

Rovensa Next on biostimulaatorite väljatöötamises ja tootmises juhtpositsioonil, omades üle 30 aastast kogemust. Meie tootevalikus on nii aastakümnete jooksul järeleproovitud kui ka uued ja uuenduslikud lahendused, mis on muutunud hindamatuks abiks ekstreemsetes kasvutingimustes ning oluliseks töövahendiks kaasaegsele põllumehele.

Selles artiklis käsitleme peamisi probleeme, millega enamik taimekasvatajaid seisab silmitsi 2026. aasta hooajal, ning pakume välja võimalikke lahendusi, mis aitavad vähendada riske ja kahjusid, soodustavad kultuuride arengut ja saagi kujunemist. Meie pakutavad lahendused hõlmavad nii aastakümnete jooksul tõestatud kui ka uusi ja uuenduslikke tooteid, mis on muutunud hindamatuks abiks ekstreemsetes kasvutingimustes ning oluliseks töövahendiks kaasaegsele põllumehele.

1. Tõhusaim lahendus taime kasvu stimuleerimiseks

Suur osa teraviljapõldudest läks talvele vastu võrsumisfaasi saavutamata. Liigne niiskus pidurdas juurestiku arengut, samal ajal kui madal temperatuur piiras toitainete omastamist. Kevadel on kõige olulisem ja kiireloomulisem ülesanne tagada sellistele taimedele piisav kogus toitaineid, soodustada juurestiku arengut, maaepalse osa kasvu, võrsumist ning üldist kasvu. Selle eesmärgi saavutamiseks sobivaim toode on Ruter AA. Alustage hooaega, tehke esimesed pritsimised Ruter AA-ga kulunormiga 2 l/ha. Toodet võib segada KAS väetistega või lisada esimeste taimekaitsevahendite pritsimislahustesse.

Ruter AA sisaldab vajalikke aminohappeid, mis stimuleerivad intensiivset kasvu, samuti NPK-d ja olulisi mikroelemente. Ruter AA-ga pritsitud taimed on paremini arenenud, varustatud toitainetega ja vastupidavamad ebasoodsatele kevadistele kasvutingimustele.



2. Parim, mida saate mullale anda

Mulla struktuursus on sageli taimekasvu peamiseks piiravaks teguriks – nii raskes savimullas kui ka kerges liivmullas kasvavad taimed sageli halvemini ja on stressis. Huumusaineid võib pidada tegelikeks mullaviljakuse kandjateks, sest nad:

- parandavad mulla struktuursust – tänu suurele molekulaarstruktuurile ja võimele moodustada suuremaid agregaatide muudavad huumusained savimulla kergemaks ning suurendavad kerge liivsavi või liiva sidusust.
- seovad niiskust oma struktuurides ja vabastavad seda järk-järgult taimede juurtele – see on eriti oluline põuaajaperioodidel.
- on oluliseks toidullikaks mullamikroorganismidele, suurendavad orgaanilise aine hulka ja parandavad mulla bioloogilist aktiivsust.

Humistaris sisalduvad humiin- ja fulvohapped on taimedele otsene toidullikas – neid omastatakse nii lehtede kui ka juurte kaudu, soodustades intensiivsemat arengut.

Humistari kasutamine: kasuta Humistari varakevadel 2 l/ha taimede kasvu ja juurestiku arengu stimuleerimiseks. Humistari võib segada Ruter AA-ga, samuti lisada KAS väetistesse või esimestesse taimekaitsevahendite pritsimislahustesse.



3. Esmaabi külmakahjustuste, põlenud, närbunud või muul viisil kahjustatud kultuuride puhul

2025. aasta jättis selge jälje – paljudel põldudel täheldati taimedel põletust pärast kasvuregulaatorite või fungitsiididega pritsimist jahedates tingimustes, samuti kahjustusi, mis ilmnedid veel pika aja jooksul pärast öökülma. Agressiivsed herbitsiidid, ebasoodsad pritsimistingimused või KAS väetised põhjustavad sageli tõsiseid kahjustusi lehtedel ja fütotoksisilust.

Kui pärast pritsimist täheldatakse taimede heledamaks muutumist, kolletumist, pruune nekrootilisi laike, deformatsioone, kasvu aeglustumist või lehtede arengu pidurdumist, on vaja kohe tegutseda ja anda taimedele esmaabi – Delfan Plus. Aminohapped on taimedele äärmiselt väärtuslik ja kergesti omastatav toidullikas.



Delfan Plus on kõrge kontsentratsiooniga aminohappetoode, millel on tugev taastav toime kriitilistes olukordades.

Delfan Plus'iga pritsimine 2 l/ha pärast kemikaalidest tingitud, kuuma- või põuastressi aitab taimedel kiiremini taastuda, soodustab uute lehtede moodustumist ning vähendab stressi mõju ja võimalikku saagikadu. Et vähendada taimekaitsevahendite negatiivset mõju juba pritsimise ajal, soovitatav segadesse lisada Delfan Plus kulunormiga 0,5-1 l/ha.

Oluline tingimus aminohapete kasutamisel pärast kevadisi öökülmi on see, et enne mis tahes pritsimist tuleb oodata taimede kasvu taastumist ja stabiilseid temperatuure, kui nii päeval kui ka öösel püsib temperatuur üle +5 °C.

4. Külma- ja kuumastressi riski vähendamine aitab saavutada suuremat saaki

Kevadised öökülmad ja isegi tugevam külm rapsi pungade moodustumise ning õitsemise faasis on igal aastal korduv nähtus ning kujutab endast põllumajandustootjale olulist rahalist kahju. Kui õisikud on juba külmast kahjustatud, on praktiliselt võimatu taimedele tõhusat abi anda – osa saagist on jäänud kaotatud. Seetõttu mõistavad üha rohkem põllumehi, kui tähtis on ennetus, et taimed oleksid ettevalmistatud ja rapsisaak külmakahjustuste eest kaitstud.

Phylgreen ja Phylgreen B Mo on merevetika *Ascophyllum nodosum* ekstraktil põhinevad tooted, mida tuleb kasutada 7-2 päeva enne prognoositavaid öökülmi. Selle aja jooksul jõuavad taimed omastada suhkruid, mannitooli ja osmolüüte, valmistudes eesootavaks stressiks, ning madalate temperatuuride ajal püsivad rakud kahjustusteta. Praktika näitab, et ilmaprognoose tuleb jälgida väga hoolikalt ja pritsimist ei tohi jätta viimasele päevale. Öökülmad võivad saabuda üks või isegi mitu ööd varem, sõltuvalt piirkonnast või konkreetse põllu reljeefist.

Phylgreen ja Phylgreen B Mo sobivad ka kaunviljade õite kaitsmiseks kuumuse või muude ebasoodsate tingimuste eest. Lisaks näitas Phylgreen 2025. aasta kevadel suurepäraseid tulemusi talinisu saagi kaitsmisel, kui seda kasutati enne öökülmi.



5. Iga pritsimine peab olema tõhus

Üha rohkem põllumehi mõtleb sellele, kas taimekaitsevahendeid kasutatakse tõhusalt ja eesmärgipäraselt. Kõige kallim pritsimine on see, mis ei toimi, mistõttu on oluline hinnata üht olulisemat pritsimiskvaliteeti mõjutavat tegurit – kasutatavat vett. Vee pH võib oluliselt kiirendada paljude taimekaitsevahendite toimeainete lagunemist pritsipaagis, samas kui vee karedus (Ca ja Mg vesinikkarbonaadid) blokeerib toimeained ning pritsimise efektiivsus võib väheneda isegi kümneid kordi.

Spray Plus on veeparandaja, mis hapestab vee täpselt vajalikule pH tasemele (4,5 või 5,5) ning pehmemad tõhusalt vett, neutraliseerides vesinikkarbonaate.

Kui soovite kontrollida pritsimiseks kasutatava vee kvaliteeti, teha kindlaks sobivaimad veevõtukohtad ja arvutada välja vee omaduste parandamiseks täpse Spray Plus koguse, võtke ühendust Baltic Agro müügiesindaja või Rovensa Next esindajaga.

